



QUEEN CITY

GASTROENTEROLOGY
& HEPATOLOGY

320 Lillington Ave, Suite 101

Charlotte, NC 28204-3189

24 Hour pH Test Instrucciones

1. No tome antiácidos (Tums, Roloids, Maalox, Mylanta, Carafate, etc) durante 24 horas antes de la prueba a menos que se indique lo contrario por su médico.
2. No coma ni beba nada después de la medianoche la noche antes del examen.
3. Tenga en cuenta: Usted no va a ser sedado para este procedimiento, por lo tanto usted no necesita que nadie lo lleve a casa. El procedimiento tarda aproximadamente una hora a noventa minutos.
4. Tiene que usar una camisa o blusa con botones en la parte delantera.
5. Por favor, pasen a la Oficina para registrarse y llegue al GI Laboratorio una hora antes de su procedimiento.
6. Usted recibirá una hoja de instrucciones. Por favor, siga cuidadosamente. Usted debe mantener sus actividades lo más cerca posible a su rutina habitual. Usted probablemente tendrá que tomar el día libre en el trabajo, ya que tendrá un pequeño tubo en la cara. Usted deberá volver al trabajo después de que el tubo se le retire al día siguiente.

Las instrucciones siguientes son para manometría esofágica y estudios de motilidad:

1. No tome Reglan o Propulsid durante 72 horas antes de la prueba a menos que se indique lo contrario por su médico.
2. No coma ni beba nada después de la medianoche la noche antes del examen.

Si tiene alguna pregunta, por favor llámenos a nuestra oficina al 704-362 – 4403